Kiwaï - actinidia arguta

Description

Le kiwaï, originaire d'Extrême-Orient, rustique (-20°C) est une plante grimpante parente du kiwi, cultivée pour ses fruits comestibles.
Ces derniers sont des baies ovales, plus petites et aromatiques que les kiwis, à peau lisse comestible, poussant en grappe, pouvant se conserver une quinzaine de jours au frais, être congelé, ou séché, et est délicieux en confitures, sorbets, pâtisseries.
Hormis quelques variétés autofertiles, des pieds femelles portant les fruits, nécessitent des pieds mâles (un pour cinq) pour être pollinisés.
Il peut être conduit sur tous les supports/arbre s'étendant rapidement jusqu'à 5m de hauteur sur 3 mètres de diamètre, pour peu qu'ils aient une exposition à l'ombre, mi-ombre ou ensoleillée. Il apprécie les sols frais et produira dès sa deuxième année.

Culture

Écrire ici

Maladies et ennemis

Écrire ici

Associations positives

Écrire ici

Associations négatives

Écrire ici

Densification et guildes

Écrire ici

Utilisations

Écrire ici

Comestibilité

Écrire ici

Recettes

Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple **:fr:plants:recettes:nom_de_la_recette**)

Multiplication

La multiplication s'effectue en bouture herbacée de Juin à Août, ou sur rameaux lignifiés dans un substrat en automne/hiver, à l'étouffée, au chaud.

Semis

Le semis s'effectue idéalement en serre froide en novembre avec des graines fraîches, mais attention, il y aura beaucoup plus de pieds mâles que de pieds femelles.
1 : Rincer les graines (la chair du fruit inhibe la germination)
2 : Poser les graines sur un papier essuie-tout humide à l'étouffée, et laisser germer, les graines mettent 2 à 3 mois pour germer autour de 10°C.
3 : Rempoter après germination, et conserver les jeunes semis à l'abris du vent et du gel les deux premières années.

4 : Planter après les risques de gelées, en Mai ou Juin.

Variétés

Variétés :	**Nom de variété (exemple)**	**Ananasnaya** 	**Chang Bai Giant**	**Cherry Bomb**	**Cordifolia Meyers**	**Geneva**	**Super Issai**	**Vitikiwi**	**Weiki Mâle**	**Weiki Plus**
Exposition :	Ensoleillée	Ensoleillée et mi-ombre	Ensoleillée et mi-ombre	Ensoleillée et mi-ombre	Ensoleillée et mi-ombre	Ensoleillée et mi-ombre	Ensoleillée et mi-ombre	Ensoleillée et mi-ombre	Ensoleillée et mi ombre	Ensoleillée et mi-ombre
Strate :	Arbustive	Liane	Liane	Liane	Liane	Liane	Liane	Liane	Liane	Liane
Rusticité (zone) :	Zone 8a	Zone 8b	Zone 8b	Zone 8b	Zone 8b	Zone 8b	Zone 8b	Zone 8b	Zone 8b	
Espacement mini :	2,5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	5m	
Hauteur :	4 à 6m	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m	jusqu'à 5m	
Envergure :	~ 5m	jusqu'à 4m	jusqu'à 4m	jusqu'à 4m	jusqu'à 4m	jusqu'à 4m	jusqu'à 4m	jusqu'à 4m	jusqu'à 4m	
Port :	Buissonnant, irrégulier	Grimpant	Grimpant	Grimpant	Grimpant	Grimpant	Grimpant	Grimpant	Grimpant	
Feuillage :	Persistant	Caduque	Caduque	Caduque	Caduque	Caduque	Caduque	Caduque	Caduque	Caduque
Floraison :	juillet et Août									
Fertilité :	Autostérile	Autostérile, nécessite pied mâle	Autostérile, nécessite pied mâle	Autostérile, nécessite pied mâle	Autostérile, nécessite pied mâle	Autostérile, nécessite pied mâle	Partiellement Autofertile	Parthénocarpique, pas de pépins si pas de pied mâle	Fleurs mâles	Fleurs mâles
Diamètre des fruits :	5cm									
Maturité des fruits :	Octobre/Novembre	Fin Septembre	Octobre	Fin Août	Fin Septembre	Début Septembre	Fin Septembre	Septembre et Octobre	Nkant	
Résistance bioagresseurs :	Oui									

(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) | Oui.
(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) | Oui.
(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) | Oui.
(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) | Oui.
(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) | Oui.
(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) | Oui.
(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) | Oui.
(Jeunes plants sensibles aux gastéropodes) |

Croissance :	Lente	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide	Rapide
pH idéal du sol :	5,5 à 7										
Longévité :	60 à 100 ans										
Stade adulte :	~8 ans										
Productivité (adulte) :	~15Kg/plant										
Fructification (de semis) :	4 à 5 ans										
Fructification (clonage) :	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Saison de Plantation :	Automne/Printemps	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées	Printemps, après les gelées

Photographies et images

Intégrer quelques photographies ou croquis ici

Liens externes / retours d’expériences

Écrire ici

From:
https://pepinature.org/ - **PEPINATURE.ORG**

Permanent link:
https://pepinature.org/fr/plants/actinidia/actinidia_arguta/kiwai

Last update: **2022/10/20 21:59**