

# Akébie - akebia quinata

## Description

Arbuste dioïque, caduque, à rameaux volubiles, offrant de mars en mai, des petites grappes de fleurs, violettes, voir pourpres, assez parfumées.

## Culture

L'akébie apprécie idéalement une terre de jardin franche, un peu sableuse, sans humidité permanente.

La plantation s'effectue en planches ou par lignes doubles, un peu élevées du sol et buttées, à 35 cm de distance en tous sens.

## Maladies et ennemis

Écrire ici

## Associations positives

Écrire ici

## Associations négatives

Écrire ici

## Densification et guildes

Écrire ici

## Utilisations

Écrire ici

## Comestibilité

Écrire ici

## Recettes

Rajouter des liens vers de nouvelles pages de l'encyclopédie vers des recettes. (Une page par recette, par exemple :fr:plants:recettes:nom\_de\_la\_recette )

## Multiplication

### Marcottage

À effectuer au printemps, en couchage simple ou en serpenteau, avec une incision sous un œil, idéalement dans un mélange de terreau de feuilles et sable de rivière. La marcotte sera ensuite sevrée puis repiquée en septembre.

### Bouturage

-**Bouturage de rameaux semi-ligneux** bouturés à l'étouffée, sous abri, en juillet, idéalement dans un mélange de terre sableuse et de terreau, avec des bassinages fréquents.

-**Bouturage de racines** préparées en février, mises à plat dans une caissette à boutures sur nappe chauffante, en mars.

### Greffe

La Greffe est possible en demi-fente sur ses propres racines, à l'étouffée, en mars-avril.

## Semis


La graine doit être semée fraîche, à l'étouffée, en serre, idéalement dans un mélange de terre de bruyère et de sable. La jeune plante sera alors repiquée en godet, à l'apparition de sa quatrième feuille.

## Variétés

| Variétés :                   | <font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> | <font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> | <font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> | <font inherit/inherit;#2980b9;;inherit>Nom de variété (exemple)</font> |
|------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Exposition :</b>          | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Ensoleillée</font>              |  |  |  |
| <b>Strate :</b>              | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Arbustive</font>                |  |  |  |
| <b>Rusticité (zone) :</b>    | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Zone 8a</font>                  |  |  |  |
| <b>Espacement mini :</b>     | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>2,5m</font>                     |  |  |  |
| <b>Hauteur :</b>             | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>4 à 6m</font>                   |  |  |  |
| <b>Envergure :</b>           | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>~5m</font>                      |  |  |  |
| <b>Port :</b>                | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Buissonnant, irrégulier</font>  |  |  |  |
| <b>Feuillage :</b>           | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Persistant</font>               |  |  |  |
| <b>Floraison :</b>           | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Juillet et Août</font>          |  |  |  |
| <b>Fertilité :</b>           | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Autostérile</font>              |  |  |  |
| <b>Diamètre des fruits :</b> | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>5cm</font>                      |  |  |  |
| <b>Maturité des fruits :</b> | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Octobre/Novembre</font>         |  |  |  |

|                                    |   |  |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Résistance bioagresseurs :</b>  | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Oui</font>               |  |  |  |
| <b>Croissance :</b>                | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Lente</font>             |  |  |  |
| <b>pH idéal du sol :</b>           | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>5,5 à 7</font>           |  |  |  |
| <b>Longévité :</b>                 | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>60 à 100 ans</font>      |  |  |  |
| <b>Stade adulte :</b>              | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>~ 8 ans</font>           |  |  |  |
| <b>Productivité (adulte) :</b>     | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>~15Kg/plant</font>       |  |  |  |
| <b>Fructification (de semis) :</b> | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>4 à 5 ans</font>         |  |  |  |
| <b>Fructification (clonage) :</b>  | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>2 ans</font>             |  |  |  |
| <b>Saison de Plantation :</b>      | <font inherit/inherit;#7f8c8d;;inherit>Automne/Printemps</font> |  |  |  |

## Photographies et images



## Liens externes / retours d'expériences

Écrire ici

From:

<https://pepinature.org/> - **PEPINATURE.ORG**

Permanent link:

[https://pepinature.org/fr/plants/akebia/akebia\\_quinata/akebie](https://pepinature.org/fr/plants/akebia/akebia_quinata/akebie)

Last update: **2022/10/30 21:48**

